

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan Evaluasi Efektivitas Terapi Pengobatan Terhadap Pasien Skizofrenia Dengan *Positive And Negative Symptoms Scale Excited Component* (PANSS-EC) dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan efektivitas terapi yang bermakna dari penggunaan antara obat antipsikotik haloperidol dan klorpromazin dengan terapi obat antipsikotik klorzapin, risperidone kombinasi, risperidone-klorzapin dan olanzapine karena sama-sama efektif dalam menurunkan skor PANSS-EC.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mengenai Evaluasi Efektivitas Terapi Pengobatan Terhadap Pasien Skizofrenia Dengan *Positive And Negative Symptoms Scale Excited Component* (PANSS-EC).

5.2.2 Saran Bagi Institusi Kesehatan

Sebagai upaya lanjut dalam menangani pasien skizofrenia secara intensif dengan menyediakan pengobatan yang lebih efektif di Provinsi Kalimantan Selatan.

5.2.3 Saran Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bentuk kerja sama Fakultas dengan RSJ yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan agar bisa dilakukan penelitian lainnya yang lebih mendalam terkait dengan evaluasi efektivitas pengobatan terhadap pasien skizofrenia dengan PANSS-EC