

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Pemberian antibiotik harus memperhatikan pola kuman penyebab tersering yang ada di suatu rumah sakit. Pemilihan antibiotik yang digunakan berdasarkan pola kuman yang mempengaruhi sepsis, sebagian bakteri penyebab sepsis neonatorum mempunyai sensitifitas terhadap antibiotik lini pertama yaitu ampicilin dan gentamisin yang dapat diberikan secara kombinasi juga satuan. Pemberian ampicilin dan gentamisin ini diberikan karena penggunaan antibiotik yang dipakai dimulai dengan antibiotik dengan efek samping terkecil untuk tubuh agar tidak menimbulkan resistensi bakteri terhadap antibiotik

1.2. Saran

- 1.2.1. Pemberian antibiotik yang sesuai harus memperhatikan pola kuman penyebab tersering yang ada di suatu rumah sakit tersebut serta didukung dengan pemeriksaan kultur darah.
- 1.2.2. Terbatasnya referensi yang berkaitan dengan penggunaan antibiotik pada sepsis neonatorum, sehingga membuat peneliti kesulitan untuk menentukan hasil berdasarkan dari banyak jurnal terkait, semoga kedepannya makin banyak peneliti yang membahas permasalahan ini dalam penelitiannya.