

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian menggunakan metode studi literatur terkait dengan profil pola pengobatan antidiabetik pada pasien penderita diabetes melitus tipe 2 dapat diperoleh kesimpulan bahwa pola pengobatan diabetes melitus menunjukkan penggunaan obat golongan biguanid disusul dengan golongan sulfonilurea, Dipeptidyl Peptidase-IV Inhibitor, penghambat alpha glukosidase, Tiazolidinedion, Sodium Glucose Co-transporter 2, glinid, Glucagon-Like Peptide-1.

#### **5.2 Saran**

- 5.2.1 Bagi peneliti lainnya dapat melakukan penelitian serupa namun dengan kriteria yang berbeda seperti evaluasi pola pemberian obat antidiabetik pada pasien diabetes mellitus tipe 2
- 5.2.1 Bagi instansi Rumah sakit dikarenakan penyakit diabetes melitus merupakan penyakit yang prevalensinya tinggi, untuk itu kepada rumah sakit untuk menerapkan pelayan farmasi klinik, khususnya asuhan kefarmasian (pharmaceutical care), sehingga pencapaian hasil terapi obat serta keamanan pasien menjadi lebih optimal
- 5.2.3 Dengan adanya studi literatur ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya, karena masih sedikit penelitian pada bidang farmasi yang menggunakan studi literatur sebagai metode penelitiannya
- 5.2.4 Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih memahami tentang pengelolaan diabetes mellitus tipe 2.