

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5,1 Kesimpulan

1. Profil pengobatan pada pasien hipertensi untuk pengobatan tunggal paling banyak menggunakan golongan B-Blockers mencapai (n=249.111), pengobatan kombinasi 2 terapi paling banyak menggunakan ARB+Diuretik (n=193), kombinasi 3 terapi pada obat ACEI+Diuretik+B-Blockers (n=47) dan kombinasi 4 terapi yang paling banyak pada CCB+ARB+ACEI+Diuretik (n=17).
2. Kejadian ADR paling besar terjadi pada golongan obat B-Blockers 21,67% dan paling kecil pada golongan obat ARB 8,31%, Penggunaan terapi kombinasi juga memberikan persentase kejadian ADR sebesar 23,28% pada golongan ARB+Diuretik, ARB+CCB+Diuretik 34,64% dan CCB+ARB+ACEI+Diuretik sebesar 19,54%. Reaksi yang paling banyak ditemukan adalah pusing, sakit kepala, bradikardi, hyperkalemia.

5.2 Saran

1. Penulis berharap penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk melihat kejadian ADR yang terjadi pada obat.
2. Perlu dilakukan penelitian dengan metode prospektif guna mengetahui reaksi ADR lebih rinci yang terjadi pada pasien hipertensi.