

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Pola penggunaan terapi golongan statin pada pasien stroke iskemik berdasarkan studi literatur yaitu Atorvastatin dengan dosis 10 mg, 20 mg, 40 mg dan 80 mg; Simvastatin 10 mg, 20 mg, 40 mg, dan 80 mg; Rosuvastatin 5 mg, 20 mg, dan 40 mg; dan yang terakhir Pravastatin dengan dosis 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Evaluasi terapi obat golongan statin dengan intensitas tinggi sangat direkomendasikan untuk meningkatkan hasil kondisi klinis pasien, menurunkan risiko kematian dan memberikan hasil fungsional luaran yang baik pada pasien. Akan tetapi, perlunya perhatian yang seksama terhadap interaksi obat dan efek samping obat yang tidak diinginkan terhadap pasien terkena stroke iskemik.

5.2 SARAN

1. Perlu dilakukannya penelitian uji klinis yang besar untuk benar-benar membuktikan khasiat dan keamanan statin dari pemberian dosis yang berbeda, pengaruh pengobatan lainnya dan jenis keparahan awal stroke.
2. Disarankan pada peneliti farmasis selanjutnya perlu dilakukan penelitian secara langsung ke lapangan melalui Rumah Sakit yang akan dilakukan penelitian agar mendapatkan data yang lebih valid, tujuannya untuk dapat membandingkan data secara studi literatur dengan data secara langsung yang didapatkan di lapangan apakah perbandingan tersebut berkaitan atau tidak.
3. Disarankan perlu adanya peran seorang farmasis nantinya dalam mengkaji peresepan yang telah diberikan pada pasien stroke iskemik, terutama mengenai akibat dan manfaat yang berfokus pada penggunaan statin.