

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan sampel 68 resep pasien diabetes melitus di wilayah kerja Puskesmas Angsau dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Terjadinya risiko interaksi obat terhadap persepan obat antidiabetik oral di Puskesmas Angsau di dapat persentase sebesar 52,94% dan tidak terjadi risiko interaksi obat sebesar 47,06%. Kejadian interaksi obat level *significant* terbanyak dengan 25 kejadian (51,02%), *minor* sebanyak 22 kejadian (44,90%) dan *serious* 2 kejadian (4,08%).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan maka diperoleh saran sebagai berikut :

5.2.1 Bagi Petugas Kesehatan

- a. Perlu dilakukan monitoring penggunaan obat oleh dokter dan apoteker atau tenaga teknis kefarmasian
- b. Perlu ditingkatkan komunikasi antara farmasis dan dokter dalam menentukan terapi untuk mencegah terjadinya interaksi

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diperlukan penelitian dengan menggunakan metode prospektif sehingga diketahui efek yang ditimbulkan akibat interaksi obat, dan dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan pengobatan sehingga diperoleh hasil yang diharapkan.