

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Gambaran perbandingan efektivitas biaya penggunaan obat Candefion[®] dan Candefress[®] pada pasien stroke dengan hipertensi di Klinik Millenia yang lebih efektif ialah terapi obat Candefress[®].
- 5.1.2 Persentasi efektifitas terapi dari penggunaan Candefress[®] 92% dan Candefion[®] 80% pada pasien stroke dengan hipertensi di Klinik Millenia.
- 5.1.3 Rata-rata total biaya dari penggunaan obat Candefress[®] yaitu sebesar Rp.1.149.940 sedangkan total biaya rata-rata penggunaan obat Candefion[®] yaitu sebesar Rp.1.042.100 pada pasien stroke dengan hipertensi di Klinik Mellinia.
- 5.1.4 Antihipertensi yang lebih efektif dalam pembiayaannya pada pasien stroke dengan hipertensi yaitu obat Candefress[®] dibanding obat Candefion[®] di Klinik Millenia.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi institusi

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas biaya pengobatan stroke dengan hipertensi dan komplikasi penyakit lainnya menggunakan metode penelitian secara prospektif dengan jumlah sampel lebih banyak dan periode yang lebih lama.

5.2.2 Bagi Klinik Millenia.

Pengobatan stroke dengan hipertensi dengan menggunakan obat antihipertensi Candefress[®] dapat direkomendasikan untuk Klinik Millenia

karena secara farmakoekonomi lebih efektif dalam biaya dan terapi obat (*cost effective*).

5.2.3 Bagi penulis

Perlu dilakukan penelitian gambaran efektivitas biaya dengan gambaran biaya yang lebih terperinci.