

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian evaluasi penggunaan Antibiotik pada pasien ulkus diabetikum di instalasi rawat inap di RSUD Idaman Banjarbaru dapat disimpulkan bahwa Antibiotik efektif terhadap subjek penelitian yaitu dapat memberikan respon pada penurunan leukosit sebesar 86,20%, penurunan nyeri sebesar 93,10%, dan penurunan demam sebesar 13,79% setelah pemberian antibiotik 1-3 hari dan hasil terapi maksimal pada hari ke 7-21 setelah pemberian Antibiotik, dan antibiotik tunggal yang paling banyak digunakan pada pasien ulkus diabetikum adalah cefriaxone sebesar 27,58% serta antibiotik kombinasi yang paling banyak digunakan adalah ceftriaxone + metronidazole sebesar 48,27 %.

5.2. Saran

5.2.1. Terhadap pelayanan kesehatan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan klinis dalam menangani masalah terkait penggunaan antibiotik pada pasien ulkus diabetikum

5.2.2. Terhadap institusi pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Menjadi bahan referensi dan literatur mengenai evaluasi antibiotik pada pasien ulkus diabetikum

5.2.3. Terhadap peneliti selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara prospektif agar diketahui secara pasti keadaan pasien saat dirawat dirumah sakit. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal