BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pola gambaran pengobatan covid (SARS-CoV-2) di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh periode April 2020 – Maret 2021 terdapat 13 jenis antibiotika.
- 5.1.2 Kuantitas penggunaan antibiotika tiga terbesar yang digunakan untuk pengobatan adalah Levofloxacin 76,5067 DDD/100 *patient-days*, Azithromicin 40,1417 DDD/100 *patient-days* dan Moxifloxacin 5,9610 DDD/100 *patient-days*, dengan total dari seluruh antibiotika 128,4124 DDD/100 *patient-days*.

5.2 Saran

- 5.2.1 Dapat dilakukan penelitian dengan metode lain seperti metode Gyssens untuk dapat mengevaluasi lebih jauh terkait ketepatan indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis maupun tepat lama pemberian sebagai bentuk penanganan dan pencegahan dari resistensi antibiotika di rumah sakit.
- 5.2.2 Perlu dilakukannya kerja sama akademisi dengan instansi rumah sakit terkait pemantauan dan juga pengawasan penggunaan antibiotika di wilayah atau kota setempat sehingga terjaminnya penggunaan antibiotika dengan efisien sehingga dapat melakukan pengendalian resistensi antibiotika.
- 5.2.3 Perlu dilakukan perbandingan penelitian terkait metode DDD yang ada di suatu wilayah sehingga dapat menjadi gambaran dan perbandingan penggunaan antibiotika di wilayah ataupun kota antar rumah sakit sehingga dapat dilihat apakah penggunaan antibiotika di suatu wilayah atau kota tersebut memang memiliki rasio yang tinggi.