

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penggunaan obat Indomethacin efektif dalam mengatasi gout setara dengan obat lain seperti obat Prednisolone dan obat Etoricoxib. Efek samping dari penggunaan obat Indomethacin dalam jangka pendek (5 hari) maupun jangka panjang (14 hari) lebih banyak terjadi dan banyak menyebabkan pasien berhenti melakukan pengobatan. Dari semua obat antara Indomethacin, Prednisolone, dan Etoricoxib efek samping yang sering muncul yaitu gangguan pada saluran pencernaan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktisi

Untuk dokter dan staf medis lainnya harus mempertimbangkan penggunaan Indomethacin karena efek sampingnya untuk mengobati gout. Serta dokter dan staf medis lainnya juga harus mempertimbangkan kondisi pasien saat memutuskan bahwa pasien tersebut cocok untuk menggunakan obat Indomethacin dalam mengobati gout. Dokter dan staf medis lainnya juga dapat memilihkan obat jenis NSAID lainnya dengan efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan obat Indomethacin. Untuk efek samping yang paling sering muncul di antara obat Indomethacin, obat Prednisolone, dan obat Etoricoxib yaitu pada gangguan pencernaan.

5.2.2 Saran Akademis

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan hal yang serupa dengan melakukan pengambilan data secara langsung di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun puskesmas. Dimana penelitian tersebut berfokus pada pilihan jenis NSAID yang lain dengan keefektifan yang setara dengan

Indomethacin dan memiliki efek samping yang lebih kecil terjadi pada pasien gout

