

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) setelah vaksinasi COVID-19 gejala KIPI yang paling umum dari vaksin Sinovac, Moderna, dan Pfizer adalah nyeri di area suntikan, bengkak di area suntikan, demam, sakit kepala, artralgia, myalgia, penambahan nafsu makan, rasa mengantuk dan kelelahan.

5.2 Saran

1. Bagi Puskesmas

Pendataan terkait jenis vaksin yang digunakan dan KIPI yang dialami masyarakat dapat terdokumentasi dengan lebih baik dan tersusun secara sistematis. Diharapkan pihak puskesmas dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) agar dapat meningkatkan pengetahuan terkait kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dan bisa merubah pandangan masyarakat terkait dengan vaksinasi terutama terhadap KIPI sehingga bisa menjadi sarana promosi dalam program vaksinasi.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan sebagai referensi pemikiran dan dapat menjadi sumber referensi serta pustaka yang berkaitan dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dengan jenis vaksin yang lainnya dan dengan cakupan wilayah yang lebih luas