

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan:

5.1.1 Terdapat 45 ibu (10,7%) yang mengalami preeklampsia

5.1.2 Terdapat 378 bayi (89,8%) dengan asfiksia neonatorum

5.1.3 Tidak ada hubungan yang bermakna antara preeklampsia dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2017.

5.2 Saran

Berdasarkan kejadian diatas dapat disimpulkan :

5.2.1 Bagi Rumah Sakit

Dari penelitian ini diharapkan pihak instansi bersangkutan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada tenaga medis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pada ibu hamil yang memiliki resiko melahirkan bayi dengan asfiksia dan mengadakan pelatihan untuk manajemen kegawatdaruratan khususnya pada bayi dengan asfiksia.

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat menambah bahan keperspustakaan yang terkait dengan faktor kejadian asfiksia.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan faktor-faktor selain preeclampsia yang menyebabkan asfiksia.

5.2.4 Bagi Responden

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan ibu hamil yang menderita preeklampsia dengan kejadian asfiksia neonatorum.