

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan di Puskesmas Teluk Tiram periode 8-20 Juni 2023 mengenai ADR obat golongan NSAID pada pasien osteoarthritis menunjukkan dari 31 pasien yang diwawancarai dan dilakukan monitoring selama 3-5 hari, didapatkan 2 pasien (6,45%) mengalami kejadian ADR akibat obat NSAID. Kedua pasien yang dinyatakan mengalami ADR dengan menunjukkan gejala yaitu sakit pada bagian perut dan rasa perih di bagian lambung. Meloxicam 7,5 mg merupakan jenis obat NSAID yang menyebabkan ADR di kedua kasus pada penelitian ini.

5.2 SARAN

5.2.1 Saran Untuk Pelayanan Klinis

Kepada pihak pelayanan klinis agar dapat memberikan edukasi penunjang lainnya di luar pemberian informasi obat kepada pasien osteoarthritis semisal penyuluhan, leaflet dan semacamnya tentang penggunaan obat golongan NSAID untuk meminimalisir terjadinya ADR

5.2.2 Saran Untuk Pasien

- a. Meningkatkan edukasi mengenai penggunaan obat NSAID
- b. Mematuhi aturan pakai obat yang di berikan
- c. Selalu meminum obat golongan NSAID dalam kondisi perut tidak kosong