BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pola Peresepan Obat Dispepsia di Puskesmas Gadang Hanyar Periode Januari – Maret 2023, dapat ditarik kesimpulan bahwa golongan obat yang paling banyak digunakan yaitu golongan obat Proton Pump Inhibitor (PPI) sebanyak 203 dengan persentase (46,03%), jenis obat yang paling banyak digunakan yaitu omeprazole sebanyak 164 dengan persentase (37,19%), pengobatan dispepsia tunggal yang terbanyak adalah Omeprazole sebanyak 140 dengan persentase (38,36%). serta kombinasi obat yang paling banyak digunakan yaitu antasida dengan omeprazole sebanyak 13 dengan persentase (34,21%).

5.2 Saran

saran yang ingin disampaikan oleh peneliti setelah dilakukannya penelitian adalah :

5.2.1 Bagi Peneliti

Perlu dilakukan pemberian informasi terhadap pengobatan pasien penyakit dispepsia untuk membantu dan mempercepat pengobatan pada pasien penyakit dispepsia.

5.2.2 Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bagian referensi untuk proses belajar mengajar.

5.2.3 Bagi Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian. Khususnya puskesmas sebagai bahan pertimbangan dalam pengadaan obat dispepsia agar tersedia semua jenis dan golongan obat dispepsia.