

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Gambaran Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien TB di Puskesmas Gadang Hanyar kota Banjarmasin maka dapat disimpulkan bahwa gambaran tingkat kepatuhan tinggi sebesar 66,67%, tingkat kepatuhan sedang sebesar 33,33% dan tingkat kepatuhan rendah sebesar 0% dari 15 responden.

5.2 Saran

5.2.1. Bagi Pasien

- a. Meningkatkan kepatuhan minum obat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh dokter.
- b. Meningkatkan kesadaran edukasi untuk mencegah orang terdekat tertular.
- c. Diharapkan pasien TB agar selalu menjaga pola hidup sehat.
- d. Diharapkan setiap pasien TB minimal memiliki Pengawas Minum Obat (PMO) untuk menghindari terjadinya kegagalan pengobatan.

5.2.2. Bagi Instansi Kesehatan

- a. Agar tetap memberikan pengetahuan tentang penyakit TB dan akibat jika tidak patuh minum obat.
- b. Perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara terus menerus kepada pasien dan keluarga pasien tentang pentingnya kepatuhan minum obat serta dilakukan pemantauan terapi obat untuk meningkatkan keefektifan terapi TB.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana seperti pengadaan ruang konseling tersendiri bagi pasien TB di Puskesmas Gadang Hanyar.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti yang akan melanjutkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai data dan informasi dasar untuk melaksanakan penelitian lanjut berkaitan dengan kepatuhan minum obat pada pasien TB paru, serta perlu di kembangkan metode dan desain yang berbeda.